



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



## อาการ



ไข้สูงเฉียบพลัน  
เมื่ออาหาร หน้าแดง  
ปวดศีรษะ อาเจียน



มีผื่น จุดสีแดง  
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา  
หรือถ่ายอุจจาระดำ

## การรักษา



ให้ยาลดไข้ "พาราเซตามอล"  
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ  
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึมลง  
กระสับกระส่าย นิ่งเท่าเ็น  
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง sw. ทันที



มีภาวะช็อคช่วงไข้ลด  
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว



ตับโต มึนกดเจ็บ  
บริเวณชายโครงขวา

## การป้องกัน

1. หากมีอาการ  
นำส่งสียควรรีบ  
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด  
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง  
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ  
และปรับปรุงภูมิทัศน์  
รอบบ้านให้สะอาด

